

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.06.2025

м. Київ

N 954

**Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 червня 2025 р. за N 978/44384**

Про затвердження Змін до Державних медико-санітарних нормативів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів

Відповідно до статті 16⁵ Закону України "Про пестициди і агрохімікати", підпункту 14 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року N 90), з метою удосконалення медико-санітарних нормативів для безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Державних медико-санітарних нормативів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02 лютого 2016 року N 55, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2016 року за N 207/28337 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 28 травня 2020 року N 1276), що додаються.
2. Департаменту громадського здоров'я (Тетяні Скапі) забезпечити:
 - 1) подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
 - 2) оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров'я України після здійснення державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров'я України - головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Віктор ЛЯШКО

ПОГОДЖЕНО:

**Уповноважений Верховної
Ради України з прав людини**

Дмитро ЛУБІНЕЦЬ

**Міністр аграрної політики
та продовольства України**

Віталій КОВАЛЬ

В. о. президента НАМН України

Василь ЛАЗОРИШИНЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Наказ Міністерства охорони здоров'я України
06 червня 2025 року N 954**

Зміни

до Державних медико-санітарних нормативів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02 лютого 2016 року N 55, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2016 року за N 207/28337 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 28 травня 2020 року N 1276)

1. У таблиці 6:

1) рядок 7 викласти у такій редакції:

"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Актуптенд Мікс, ТН (Actuptend Mixx, FS)		Контроль за тіаметоксамом											3 (високостійкий у воді)
		тіаметоксам, 262,5 г/л +	0,02	пшениця, ячмінь	0,2	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/сан.-токс.	/0,1	не потр.	не потр.	не потр.		
		флудіоксоніл, 25 г/л +	0,015		0,02	/1,0	/0,002	0,1/орг.	/0,2					
		дифеноконазол, 25 г/л	0,002		0,05	/0,2	/0,001	0,001/сан.-токс.	/0,3					
		тіаметоксам, 262,5 г/л +	0,02	соя (зерно)	0,04	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/сан.-токс.	/0,1	не потр.	не потр.	не потр.		
		флудіоксоніл, 25 г/л +	0,015		0,4	/1,0	/0,002	0,1/орг.	/0,2					
		дифеноконазол, 25 г/л	0,002		0,05	/0,2	/0,001	0,001/сан.-токс.	/0,3					
		тіаметоксам, 262,5 г/л +	0,02	соя (олія)	не потр.	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/сан.-токс.	/0,1	-	-	-		
		флудіоксоніл, 25 г/л +	0,015		не потр.	/1,0	/0,002	0,1/орг.	/0,2					
		дифеноконазол, 25 г/л	0,002		не потр.	/0,2	/0,001	0,001/сан.-токс.	/0,3					
		тіаметоксам, 262,5 г/л +	0,02	картопля	0,08	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/сан.-токс.	/0,1	не потр.	не потр.	не потр.		
		флудіоксоніл, 25 г/л +	0,015		0,02	/1,0	/0,002	0,1/орг.	/0,2					
		дифеноконазол, 25 г/л	0,002		0,08	/0,2	/0,001	0,001/сан.-токс.	/0,3					

"

2) рядок 51 викласти у такій редакції:

"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	Джоуст Про, КС			Контроль за протіоконазолом-дестіо (1), протіоконазолом (2), азоксистробіном									2 (високостійкий у воді)
		протіоконазол, 150 г/л	0,001 (1,2)	пшениця	0,1 (1)	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ (2) заг.- сан.	/0,2 (1)	35	не потр.	3	
		азоксистробін, 150 г/л	0,03		0,5*	/1,0	/0,01	0,01/ заг.- сан.	/0,3				
		протіоконазол, 150 г/л +	0,001 (1,2)	соняшник (насіння)	0,1 (1)	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ (2) заг.- сан.	/0,2 (1)	50	не потр.	3	
		азоксистробін, 150 г/л	0,03		0,2	/1,0	/0,01	0,01/ заг.- сан.	/0,3				
		протіоконазол, 150 г/л +	0,001 (1,2)	соняшник (олія)	не потр.	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ (2) заг.- сан.	/0,2 (1)	-	-	-	
		азоксистробін, 150 г/л	0,03		не потр.	/1,0	/0,01	0,01/ заг.- сан.	/0,3				

"

3) рядок 70 викласти у такій редакції:

"

70	Карнадін, РК (Carnadine, SL)	ацетаміпрід, 200 г/л	0,01	ріпак (насіння)	0,05	/0,2	/0,003	0,02/ сан.- токс.	/0,1	35	не потр.	3	3 (високостійкий у воді)
				ріпак (олія)	не потр.								

"

4) рядок 72 викласти у такій редакції:

"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
72	Керамокс Екстра (Ceramox Xtra), ВГ		Контроль за фамоксадом та цимоксанілом											3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей)
		фамоксадон, 250 г/кг +	0,01	соняшник (насіння)	0,04	/1,0	/0,01	0,01/ заг.- сан.	/0,4	40	не потр.	3		
		цимоксаніл, 250 г/кг	0,05		0,04	/1,0	/0,03	0,06/ сан.- токс.	/0,04					
		фамоксадон, 250 г/кг +	0,01	соняшник (олія)	0,1	/1,0	/0,01	0,01/ заг.- сан.	/0,4	-	-	-		
		цимоксаніл,	0,05		не	/1,0	/0,03	0,06/	/0,04					

		250 г/кг			потр.			сан.-токс.					
--	--	----------	--	--	-------	--	--	------------	--	--	--	--	--

„

5) рядок 75 викласти у такій редакції:

„

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	Колам Плюс, ФК (Colam Plus, ZC)			Контроль за лямбда-цигалотрином та тіаметоксамом									
		лямбда-цигалотрин, 106 г/л +	0,003	пшениця, ячмінь	0,05	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/сан.-токс.	/0,05	35	не потр.	4	2
		тіаметоксам, 141 г/л	0,02		0,2	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/сан.-токс.	/0,1				
		лямбда-цигалотрин, 106 г/л +	0,003	соняшник (насіння)	0,2	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/сан.-токс.	/0,05	30	не потр.	4	
		тіаметоксам, 141 г/л	0,02		0,4	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/сан.-токс.	/0,1				
		лямбда-цигалотрин, 106 г/л +	0,003	соняшник (олія)	0,4	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/сан.-токс.	/0,05	-	-	-	
		тіаметоксам, 141 г/л	0,02		не потр.	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/сан.-токс.	/0,1				
		лямбда-цигалотрин, 106 г/л +	0,003	картопля	0,01	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/сан.-токс.	/0,05	20	10	4	
		тіаметоксам, 141 г/л	0,02		0,08	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/сан.-токс.	/0,1				
		лямбда-цигалотрин, 106 г/л +	0,003	буряки цукрові	0,01	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/сан.-токс.	/0,05	30	не потр.	4	
		тіаметоксам, 141 г/л	0,02		0,1	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/сан.-токс.	/0,1				
		лямбда-цигалотрин, 106 г/л	0,003	томати	0,01	/0,1 небезпечний при	/0,001	0,01/сан.-токс.	/0,05	20	10	4	

		+				потрапляння на шкіру							
		тіаметоксам, 141 г/л	0,02		0,04	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/ сан.- токс.	/0,1				
		лямбда- цигалотрин, 106 г/л +	0,003	томатний сік	0,05	/0,1 небезпечний при потрапляння на шкіру	/0,001	0,01/ сан.- токс.	/0,05				
		тіаметоксам, 141 г/л	0,02		0,1	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/ сан.- токс.	/0,1				
		лямбда- цигалотрин, 106 г/л +	0,003	яблука	0,01	/0,1 небезпечний при потрапляння на шкіру	/0,001	0,01/ сан.- токс.	/0,05				
		тіаметоксам, 141 г/л	0,02		0,1	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/ сан.- токс.	/0,1	30	10	4	
		лямбда- цигалотрин, 106 г/л +	0,003	яблучний сік	0,05	/0,1 небезпечний при потрапляння на шкіру	/0,001	0,01/ сан.- токс.	/0,05				
		тіаметоксам, 141 г/л	0,02		0,05	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/ сан.- токс.	/0,1	-	-	-	

".,

6) рядок 79 викласти у такій редакції:

"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	Кромстар Плюс, КС (Kromstar Plus, SC)			Контроль за пікоксистробіном та ципроконазолом									
		пікоксистробін, 200 г/л +	0,01	пшениця	0,05	/1,0	/0,01	0,003/ заг.- сан.	/0,2				
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,05	/0,1	/0,01	0,03/ сан.- токс.	/0,01	35	не потр.	3	
		пікоксистробін, 200 г/л +	0,01	буряки цукрові	0,05	/1,0	/0,01	0,003/ заг.- сан.	/0,2				
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,1	/0,1	/0,01	0,03/ сан.- токс.	/0,01	35	7	3	
		пікоксистробін, 200 г/л +	0,01	соя (зерно)	0,1	/1,0	/0,01	0,003/ заг.- сан.	/0,2	35	не потр.	3	2 (високостійкий у воді та грунті)

	ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,2	/0,1	/0,01	0,03/ сан.- токс.	/0,01				
	пікоксистробін, 200 г/л +	0,01	соє (олія)	не потр.	/1,0	/0,01	0,003/ заг.- сан.	/0,2				
	ципроконазол, 80 г/л	0,002		не потр.	/0,1	/0,01	0,03/ сан.- токс.	/0,01	-	-	-	
	пікоксистробін, 200 г/л +	0,01	соняшник (насіння)	0,1	/1,0	/0,01	0,003/ заг.- сан.	/0,2	50	не потр.	3	
	ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,2	/0,1	/0,01	0,03/ сан.- токс.	/0,01				
	пікоксистробін, 200 г/л +	0,01	соняшник (олія)	не потр.	/1,0	/0,01	0,003/ заг.- сан.	/0,2	-	-	-	
	ципроконазол, 80 г/л	0,002		не потр.	/0,1	/0,01	0,03/ сан.- токс.	/0,01				
	пікоксистробін, 200 г/л +	0,01	ріпак (насіння)	0,1	/1,0	/0,01	0,003/ заг.- сан.	/0,2	40	не потр.	3	
	ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,2	/0,1	/0,01	0,03/ сан.- токс.	/0,01				
	пікоксистробін, 200 г/л +	0,01	ріпак (олія)	не потр.	/1,0	/0,01	0,003/ заг.- сан.	/0,2	-	-	-	
	ципроконазол, 80 г/л	0,002		не потр.	/0,1	/0,01	0,03/ сан.- токс.	/0,01				
	пікоксистробін, 200 г/л +	0,01	кукурудза (зерно)	0,1	/1,0	/0,01	0,003/ заг.- сан.	/0,2	35	не потр.	3	
	ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,2	/0,1	/0,01	0,03/ сан.- токс.	/0,01				
	пікоксистробін, 200 г/л +	0,01	кукурудза (олія)	не потр.	/1,0	/0,01	0,003/ заг.- сан.	/0,2	-	-	-	
	ципроконазол, 80 г/л	0,002		не потр.	/0,1	/0,01	0,03/ сан.- токс.	/0,01				

”;

7) рядки 111, 112 викласти у такій редакції:

”

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	Пресслар Плюс, СЕ (Presslar Plus, SE)			Контроль за пропізохлором та тербутилазином									З (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді)
		пропізохлор, 450 г/л +	0,01	кукурудза (зерно)	0,2	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	не потр.	не потр.	3	
		тербутилазин, 187,5 г/л	0,003		0,4	/1,0	/0,05	0,005/ заг.- сан.	/0,04				
		пропізохлор, 450 г/л +	0,01	кукурудза (олія)	не потр.	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	-	-	-	
		тербутилазин, 187,5 г/л	0,003		не потр.	/1,0	/0,05	0,005/ заг.- сан.	/0,04				
		пропізохлор, 450 г/л +	0,01	соєа (зерно)	0,2	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	не потр.	не потр.	3	
		тербутилазин, 187,5 г/л	0,003		0,2	/1,0	/0,05	0,005/ заг.- сан.	/0,04				
		пропізохлор, 450 г/л +	0,01	соєа (олія)	не потр.	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	-	-	-	
		тербутилазин, 187,5 г/л	0,003		не потр.	/1,0	/0,05	0,005/ заг.- сан.	/0,04				
		пропізохлор, 450 г/л +	0,01	соняшник (насіння)	0,2	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	не потр.	не потр.	3	
		тербутилазин, 187,5 г/л	0,003		0,4	/1,0	/0,05	0,005/ заг.- сан.	/0,04				
		пропізохлор, 450 г/л +	0,01	соняшник (олія)	не потр.	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	-	-	-	
		тербутилазин, 187,5 г/л	0,003		не потр.	/1,0	/0,05	0,005/ заг.- сан.	/0,04				
112	Пресслар, KE (Presslar, EC)	пропізохлор, 720 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,2	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	не потр.	не потр.	3	З (високостійкий у воді)
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
				соєа (зерно)	0,2					не потр.	не потр.	3	
				соєа (олія)	не потр.					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,2					не потр.	не потр.	3	

				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	
				кукурудза (зерно)	0,2					не потр.	не потр.	3	
				кукурудза (олія)	не потр.					-	-	-	

”;

8) рядок 121 викласти у такій редакції:

”

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
121	Рейнпріта Плюс, КС (Rainprita Plus, SC)			Контроль за імідаклопридом		Контроль за імідаклопридом та бета- цифлутрином		Контроль за імідаклопридом					(високостійкий у воді)
		імідаклоприд, 100 г/л +	0,06	пшениця, ячмінь	0,1	/0,2	/0,005	0,007/ заг.- сан.	/0,04	35	не потр.	3	
		бета- цифлутрин, 12,5 г/л	0,01		0,05	/0,01	/0,001	0,001/ заг.- сан.	/0,04				
		імідаклоприд, 100 г/л +	0,06	соя (зерно)	0,05	/0,2	/0,005	0,007/ заг.- сан.	/0,04	50	не потр.	3	
		бета- цифлутрин, 12,5 г/л	0,01		0,02	/0,01	/0,001	0,001/ заг.- сан.	/0,04				
		імідаклоприд, 100 г/л +	0,06	соя (олія)	не потр.	/0,2	/0,005	0,007/ заг.- сан.	/0,04	-	-	-	
		бета- цифлутрин, 12,5 г/л	0,01		не потр.	/0,01	/0,001	0,001/ заг.- сан.	/0,04				
		імідаклоприд, 100 г/л +	0,06	ріпак (насіння)	0,1	/0,2	/0,005	0,007/ заг.- сан.	/0,04	40	не потр.	3	
		бета- цифлутрин, 12,5 г/л	0,01		0,1	/0,01	/0,001	0,001/ заг.- сан.	/0,04				
		імідаклоприд, 100 г/л +	0,06	ріпак (олія)	не потр.	/0,2	/0,005	0,007/ заг.- сан.	/0,04	-	-	-	
		бета- цифлутрин, 12,5 г/л	0,01		не потр.	/0,01	/0,001	0,001/ заг.- сан.	/0,04				
		імідаклоприд, 100 г/л +	0,06	кукурудза (зерно)	0,05	/0,2	/0,005	0,007/ заг.- сан.	/0,04	40	не потр.	3	
		бета- цифлутрин, 12,5 г/л	0,01		0,05	/0,01	/0,001	0,001/ заг.-	/0,04				

		12,5 г/л						сан.					
		імідаклоприд, 100 г/л +	0,06	кукурудза (олія)	не потр.	/0,2	/0,005	0,007/ заг.- сан.	/0,04	-	-	-	
		бета- цифлутрин, 12,5 г/л	0,01		0,1	/0,01	/0,001	0,001/ заг.- сан.	/0,04				
		імідаклоприд, 100 г/л +	0,06	соняшник (насіння)	0,05	/0,2	/0,005	0,007/ заг.- сан.	/0,04		35	не потр.	3
		бета- цифлутрин, 12,5 г/л	0,01		0,05	/0,01	/0,001	0,001/ заг.- сан.	/0,04				
		імідаклоприд, 100 г/л +	0,06	соняшник (олія)	не потр.	/0,2	/0,005	0,007/ заг.- сан.	/0,04	-	-	-	
		бета- цифлутрин, 12,5 г/л	0,01		0,1	/0,01	/0,001	0,001/ заг.- сан.	/0,04				

".

9) рядок 146 викласти у такій редакції:

"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Контроль за сумою спіротетрамату і спіротетрамат- єнолу, вираженою як спіротетрамат, та тіаклопридом		Контроль за спіротетраматом та тіаклопридом							
146	Тетрапід Плюс, КС (Tetraprid Plus SC)	спіротетрамат, 120 г/л +	0,01	соняшник (насіння)	0,04	/1,0	/0,003	0,005/ заг.- сан.	/0,25				
		тіаклоприд, 120 г/л	0,006		0,02	/0,3	/0,002	0,005/ заг.- сан.	0,09/ водн.- мігр., фітотокс.	45	не потр.	3	2 (високостійкий у воді)
		спіротетрамат, 120 г/л +	0,01	соняшник (олія)	0,04	/1,0	/0,003	0,005/ заг.- сан.	/0,25				
		тіаклоприд, 120 г/л	0,006		не потр.	/0,3	/0,002	0,005/ заг.- сан.	0,09/ водн.- мігр., фітотокс.	-	-	-	
		спіротетрамат, 120 г/л +	0,01	ріпак (насіння)	0,04	/1,0	/0,003	0,005/ заг.- сан.	/0,25	45	не потр.	3	

		тіаклоприд, 120 г/л	0,006		0,05	/0,3	/0,002	0,005/ заг.- сан.	0,09/ водн.- мігр., фітотокс.				
		спіротетрамат, 120 г/л +	0,01		0,04	/1,0	/0,003	0,005/ заг.- сан.	/0,25				
		тіаклоприд, 120 г/л	0,006	ріпак (олія)	0,05	/0,3	/0,002	0,005/ заг.- сан.	0,09/ водн.- мігр., фітотокс.	-	-	-	

".,
,"

10) рядок 150 викласти у такій редакції:

"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
150	Трісолют Мікс, МД (Trisolut Mixx OD)			Контроль за М-4-хлорфеноксиоцтовою кислотою (2М-4Х) (1), мезосульфурон-метилом та флорасуламом		Контроль за 2М-4Х ІОЕ	Контроль за М-4-хлорфеноксиоцтовою кислотою (2М-4Х) (1), мезосульфурон-метилом та флорасуламом						
		2-метил-4-хлорфенокси-оцтової кислоти ізооктиловий ефір (2М-4Х ІОЕ), 240 г/л +	0,008 (1)		0,2 (1) / 1,0 (2)		/0,02 (1)	0,003/ орг. (1)	/0,02 (1)				3
		мезосульфурон-метил, 9 г/л +	0,1	пшениця, ячмінь	0,01	/0,6	/0,02	0,001/ заг.- сан.	/0,2	не	не	3	
		флорасулам, 6 г/л +	0,05		0,01	/1,0	/0,003	0,1/ ан.- токс.	0,05/ фітотокс.				
		мефенпір-діетил, 25,2 г/л (антидот)	не	потр.	не	потр.	не	потр.	не	потр.			

".,
,"

11) рядки 155, 156 викласти у такій редакції:

"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
155	Флока Екстра, ВГ (Flocaxtra, WG)			Контроль за сумою флонікамідів та метаболітів TFNA та TFNG у перерахунку на флонікамід									2 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді)
		флонікамід,	0,004	яблука	0,3	/1,0	/0,002	0,008/	/0,4	35	7	3	

		500 г/кг		яблучний сік	0,03			сан.-токс,					
				Яблучний сік не рекомендується для використання у дитячому харчуванні						-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,06					49	не потр.	3	
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	
				картопля	0,09					28	7	3	
156	Флоупрід Плюс, ВГ (Flowprid Plus, WG)			Контроль за сумою флонікаміду та метаболітів TFNA та TFNG у перерахунку на флонікамід, та ацетаміпридом		Контроль за флонікамідом та ацетаміпридом							
		флонікамід, 200 г/кг +	0,004	яблука	0,3	/1,0	/0,002	0,008/сан.-токс,	/0,4	42	7	3	2 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді)
		ацетаміприд, 150 г/кг	0,01		0,05	/0,2	/0,003	0,02/сан.-токс.	/0,1				
		флонікамід, 200 г/кг +	0,004	яблучний сік	0,03	/1,0	/0,002	0,008/сан.-токс,	/0,4	-	-	-	
		ацетаміприд, 150 г/кг	0,01		0,01	/0,2	/0,003	0,02/сан.-токс.	/0,1				
		флонікамід, 200 г/кг +	0,004	ріпак (насіння)	0,06	/1,0	/0,002	0,008/сан.-токс,	/0,4	49	не потр.	3	
		ацетаміприд, 150 г/кг	0,01		0,05	/0,2	/0,003	0,02/сан.-токс.	/0,1				
		флонікамід, 200 г/кг +	0,004	ріпак (олія)	не потр.	/1,0	/0,002	0,008/сан.-токс,	/0,4	-	-	-	
		ацетаміприд, 150 г/кг	0,01		не потр.	/0,2	/0,003	0,02/сан.-токс.	/0,1				
		флонікамід, 200 г/кг +	0,004	соя (зерно)	0,06	/1,0	/0,002	0,008/сан.-токс,	/0,4	56	не потр.	3	
		ацетаміприд,	0,01		0,1	/0,2	/0,003	0,02/	/0,1				

		150 г/кг						сан.-токс.					
		флонікамід, 200 г/кг +	0,004	соє (олія)	не потр.	/1,0	/0,002	0,008/ сан.-токс,	/0,4				
		ацетаміпрід, 150 г/кг	0,01		не потр.	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1	-	-	-	

".

2. У таблиці 7:

рядок 28 викласти у такій редакції:

"

28	Веранго 400 SC, КС	флуопірам, 400 г/л	0,01	картопля	0,03	1,0	0,003	0,02 сан.-токс., заг.-сан.	0,08	не потр. (внесення в борозни грунту при садінні)	не потр.	не потр. (внесення в борозни грунту при садінні)	2 (високостійкий у воді та грунті)
				цибуля (ріпка)	0,1					30	3 (після штангової обробки грунту) 7 (після крапельного поливу)	3	
				томати	0,1					20	3 (після штангової обробки грунту) 7 (після крапельного поливу)	3	
				томатний сік	0,05					-	-	-	
				суниця	0,1					14	3 (після штангової обробки грунту) 7 (після крапель- ного поливу)	3	
				суничний сік	0,05					-	-	-	

".

2) після рядка 58 доповнити новим рядком 59 такого змісту:

"

59	Камео 75, ВГ / Пойнтер, 75, ВГ	трибенурон-метил, 750 г/кг	0,005	соняшник (насіння)	0,02	0,1	0,003	0,06 заг.-сан.	0,01	не потр.	не потр.	3	3 (високостійкий у воді)
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	

";

У зв'язку з цим рядки 59 - 164 вважати відповідно рядками 60 - 165.

3) рядок 78 викласти у такій редакції:

"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	Магнелло 350 ЕС, КЕ			Контроль за дифеноконазолом та тебуконазолом									2 (високостійкий у воді та ґрунті)
		дифеноконазол, 100 г/л +	0,002	ріпак (насіння)	0,1	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3	50	не потр.	3	
		тебуконазол, 250 г/л	0,03		0,5	0,4	0,02	0,025 заг.-сан.	1,0				
		дифеноконазол, 100 г/л +	0,002	ріпак (олія)	0,2	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3				
		тебуконазол, 250 г/л	0,03		0,5	0,4	0,02	0,025 заг.-сан.	1,0				

";

4) рядок 122 викласти у такій редакції:

"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	СПАТАРО, КС			Контроль за сумою спіротетрамату і спіротетраматенолу, вираженою як спіротетрамат									3
		спіротетрамат, 100 г/л	0,01	яблука	0,3	1,0	0,003	0,005 заг.-сан.	0,25	21*	7*	3*	
				яблучний сік	0,1					-	-	-	
				томати	1,0					21*	7*	3*	
				томатний сік	0,1					-	-	-	

";

Директор Департаменту громадського здоров'я

Тетяна СКАПА